

RÉCEPTION, UTILISATION ET ENTRETIEN DU PRODUIT

- Retirez le flacon du récipient et lisez le mode d'emploi inclus pour les instructions avant l'utilisation. Retirez le sceau de sécurité rouge avant d'ouvrir le flacon et jetez-le.
- CANTHARONE® PLUS est inflammable. Le flacon doit être conservé à l'abri de la lumière du soleil, chaleur, étincelles ou flammes. Le produit doit être rangé à température ambiante.
- Utiliser un applicateur pointu pour retirer le produit du flacon et l'appliquer sur chaque verrue. Éviter de mettre le produit sur le rebord du flacon qui sécherait et rendrait difficile une fermeture hermétique. Si le produit entre en contact avec le rebord de la bouteille, nettoyez-le soigneusement avec une serviette en papier humide que vous déposerez directement dans une poubelle par la suite.
- Refermer le flacon immédiatement et hermétiquement après chaque application pour éviter l'évaporation du produit.



PRODUIT	ENREGISTREMENT SANTÉ CANADA	FORMAT	CODE DE PRODUIT
CANTHARONE® PLUS	DIN 00772011	7,5 mL	9002-975M

*CANTHARONE® EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DES LABORATOIRES DORMER INC.

Scannez le code QR pour afficher plus de ressources ou passer une commande :



LES LABORATOIRES
DORMER

91 Kelfield Street, Unit 5, Toronto, Ontario M9W 5A3

Téléphone : 1 416 242-6167 • Téléphone sans-frais : 1800 363-5040

Fax : 1 416 242-9487 • Fax sans-frais : 1 877 436 7637

info@dormer.com | www.dormer.com

Les produits Cantharone® ne sont pas approuvés pour la vente ou l'utilisation aux États-Unis

LES LABORATOIRES
DORMER

CANTHARONE®
PLUS



VÉSICATOIRE PUISSANT TRAITEMENT EFFICACE À LA CANTHARIDINE

- Verrues plantaires et périunguéales
- Verrues tenaces et fortement kératinisées
- Procédure simple en cabinet, aucun instrument spécial requis
- Application indolore

**APPLICATION RÉSERVÉE AUX
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ AGRÉÉS* SEULEMENT**

Lire les RENSEIGNEMENTS D'UTILISATION avant l'application

*À appliquer par des professionnels de la santé agréés ayant reçu une formation adéquate spécifique au traitement des affections indiquées et à la prise en charge des effets indésirables pouvant survenir suite à l'utilisation du produit.

INFORMATION GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT

AVANT D'UTILISER, VEUILLEZ LIRE RENSEIGNEMENTS D'UTILISATION FOURNIES DANS CHAQUE EMBALLAGE DE PRODUITS

CANTHARONE® PLUS

(Déconseillé pour les enfants de moins de 12 ans)

VERRUES PLANTAIRES, TENACES ET FORTEMENT KÉRATINISÉES

DESCRIPTION: CANTHARONE® PLUS est une solution topique contenant d'acide salicylique 30 % (w/v), de podophylline 2 % (w/v), de cantharidine 1 % (w/v) dans un véhicule filmogène contenant du glycol octylphénylpoléthylène, du cellosolve, de l'éthocel, du collodion, de l'huile de ricin et de l'acétone. L'acide salicylique est un kératolytique. Sa dénomination chimique est l'acide 2-hydroxybenzoïque. La podophylline est un caustique. Sa composante majeure, la podophyllotoxine (jusqu'à 60 %) est un antinéoplasique et roentgomimétique. La cantharidine est un vésicatoire. Le nom chimique est Hexahydro-3a,7a-diméthyl-4b,7b-époxyisobenzofurane-1,3-dione (C₁₀H₁₂O₄).

INDICATIONS ET MODE D'EMPLOI: CANTHARONE® PLUS est indiqué pour l'élimination des verrues, particulièrement les verrues plantaires, périunguérales, fortement kératinisées et tenaces. L'application indolore et l'absence d'instrument en font une procédure simple. Certaines douleurs peuvent survenir plus tard.

PHARMACOLOGIE CLINIQUE: CANTHARONE® PLUS est un mélange de trois agents contre les verrues: L'action de l'acide salicylique résulte, croit-on, de son activité kératolytique permettant l'élimination des cellules épithéliales infectées par le virus responsable des verrues; la podophylline a des propriétés caustiques qui provoquent la destruction du tissu et la cantharidine a des propriétés vésicantes qui, croit-on, entraînent l'exfoliation de la tumeur verruqueuse due à son action acantholytique. Le mécanisme d'action pharmacologique de chacun de ces agents n'est pas bien connu.

TRAITEMENT POUR VERRUES PLANTAIRES, TENACES ET FORTEMENT KÉRATINISÉES

MÉTHODE A (pas de curetage):

- Parfois, les ongles doivent être coupés pour exposer la verrue sous-unguéal à la médication. À l'aide d'un applicateur pointu, appliquez CANTHARONE® PLUS avec parcimonie (une seule couche) sur le dessus de zone de verrue. (Pour les grosses verrues en mosaïque, traitez une partie de la verrue à la fois). Laisser sécher quelques minutes.
- Couvrir avec d'un ruban adhésif non poreux*. Demandez au patient de garder le pansement pendant au moins 4 heures (jusqu'à 8 heures).
- Dans les 24 heures, une ampoule se forme, souvent douloureuse et inflammée. Faire revenir le patient en observation dans 1 à 2 semaines. Pendant cette période, le patient peut ou non faire des trempages périodiques selon les recommandations du médecin.
- Retirer les tissus nécrosés et traiter, si nécessaire, le tissu verruqueux encore vivant de la verrue.
- Laisser les tissus se réépithélialiser avant de refaire un nouveau traitement.

MÉTHODE B (avec curetage):

- Procédez comme dans la méthode A, mais le patient revient dans un jour pour le curetage. Une anesthésie locale peut être nécessaire.
- Il y a plusieurs avantages à cette méthode; le traitement avec CANTHARONE® PLUS avant le curetage facilite l'identification des plans tissulaires, augmente le dégagement du tissu verruqueux et un deuxième traitement est rarement nécessaire.
- Demandez au patient de revenir en observation dans 4 semaines. La lésion guérit normalement complètement en 1 à 3 semaines.

* Le ruban non poreux fait référence à Blenderm^{MC}. Il est recommandé de fixer le ruban non poreux sur la verrue plantaire avec un ruban adhésif de type Hypafix®.

BLENDERM EST UNE MARQUE DE COMMERCE DE LA COMPAGNIE 3M. HYPAFIX EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DE BSN MEDICAL LIMITED.

INFORMATION IMPORTANTE

CONTRE-INDICATIONS: L'application de CANTHARONE® PLUS est déconseillée chez les diabétiques et les patients présentant des troubles circulatoires périphériques. **NE PAS UTILISER À PROXIMITÉ DES YEUX, LE VISAGE, LES MUQUEUSES, LES RÉGIONS ANO-GÉNITALES, INTERTRIGINEUSES ET AXILLAIRES.**

CANTHARONE® PLUS n'est PAS RECOMMANDÉ pour les femmes enceintes ou qui allaitent car il n'y a PAS eu d'études adéquates ou bien contrôlées sur l'utilisation de la cantharidine. Podophyllum est suspecté d'être tératogène.

AVERTISSEMENT ET MISES EN GARDE: CANTHARONE® PLUS est un puissant vésicatoire, à utiliser avec parcimonie. La sensibilité à la cantharidine varie d'un patient à l'autre. Une réaction plus forte peut être attendue chez les patients à la peau claire et aux yeux bleus. NE PAS TRAITER DE GRANDES ZONES OU DES LÉSIONS MULTIPLES AVANT D'AVOIR ÉVALUÉ LA SENSIBILITÉ DU PATIENT AU PRODUIT. NE PAS RÉAPPLIQUER PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE SUR LA MÊME LÉSION. NE PAS APPLIQUER SUR DES TISSUS DÉJÀ IRRITÉS OU ENFLAMMÉS. L'ampoule qui se forme est souvent inflammée et douloureuse. (Voir rubrique « GESTION DE LA DOULEUR »). Différer le deuxième traitement si l'inflammation est sévère et intense. Dans de rares cas, des picotements, une sensation de brûlure ou une extrême sensibilité peuvent survenir. Si cela se produit, le patient doit retirer le ruban adhésif et tremper la zone dans de l'eau froide pendant 10 à 15 minutes et répéter au besoin pour obtenir un soulagement. Si la douleur persiste, percez l'ampoule en utilisant une méthode stérile, appliquer un antiseptique et recouvrir d'un pansement.

PRÉCAUTIONS: Les cliniciens doivent utiliser des gants sans latex lors de l'application de Cantharone® Plus. NE PAS UTILISER DE CANTHARONE® PLUS EN COMBINAISON AVEC TOUT AUTRE TRAITEMENT CHIMIQUE CONTRE LES VERRUES.

Restreindre l'application du produit sur la partie supérieure des verrues. Si du liquide est renversé sur une peau normale, essuyez-le immédiatement avec de l'acétone ou de l'alcool, suivi immédiatement d'un lavage vigoureux à l'eau tiède savonneuse et bien rincer. Si renversé sur une muqueuse ou dans les yeux, rincer à grande eau, éliminer le collodion précipité et rincer de nouveau à grande eau pendant un autre 15 minutes.

EFFETS INDÉSIRABLES: Comme pour toutes les procédures chimiques et cryogéniques, après un traitement par CANTHARONE® PLUS, des verrues annulaires superficielles peuvent se développer chez un petit pourcentage de patients. Bien qu'alarmantes pour certains patients, ces lésions sont superficielles et présentent peu de problème. Un seul cas de lymphangite chimique a été signalé à la suite de l'application d'une combinaison de collodion de cantharidine en association avec un emplâtre d'acide salicylique. Un cas de vésication extrême et douloureuse a été rapporté après le traitement de lésions axillaires multiples.

GESTION DE LA DOULEUR:

- Avertir le patient que l'ampoulé peut être douloureuse. Prescrire un analgésique léger.
- Le pansement peut être retiré et la zone trempée dans de l'eau froide pendant 10 à 15 minutes au besoin, à condition que suffisamment de temps ait été accordé pour que le médicament pénètre la verrue.
- À la discrétion du médecin, l'ampoule peut être percée à l'aide d'une technique stérile et recouverte d'un antiseptique et un pansement.

SOIN APRÈS TRAITEMENT:

- Il est recommandé d'utiliser un savon doux antibactérien jusqu'à ce que le tissu se réépithélialise.
- Fournir la feuille de renseignements Cantharone® aux patients.



LES LABORATOIRES
DORMER

À appliquer UNIQUEMENT par des professionnels de la santé agréés ayant reçu une formation adéquate spécifique au traitement des affections indiquées et à la prise en charge des effets indésirables pouvant survenir suite à l'utilisation du produit.

NE PAS distribuer ou prescrire CANTHARONE® aux patients en raison de la toxicité et du mauvais usage potentiel.