

RÉCEPTION, UTILISATION ET ENTRETIEN DU PRODUIT

- Retirez le flacon du récipient et lisez le mode d'emploi inclus pour les instructions avant l'utilisation. Retirez le sceau de sécurité bleu avant d'ouvrir le flacon et jetez-le.
- CANTHARONE® est inflammable. Le flacon doit être conservé à l'abri de la lumière du soleil, chaleur, étincelles ou flammes. Le produit doit être rangé à température ambiante.
- Utiliser un applicateur pointu pour retirer le produit du flacon et l'appliquer sur chaque verrue. Éviter de mettre le produit sur le rebord du flacon qui sécherait et rendrait difficile une fermeture hermétique. Si le produit entre en contact avec le rebord de la bouteille, nettoyez-le soigneusement avec une serviette en papier humide que vous déposerez directement dans une poubelle par la suite.
- Refermer le flacon immédiatement et hermétiquement après chaque application pour éviter l'évaporation du produit.



PRODUIT	ENREGISTREMENT SANTÉ CANADA	FORMAT	CODE DE PRODUIT
CANTHARONE® LIQUIDE	NPN 80023975	7,5 mL	9001-975M

*CANTHARONE® EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DES LABORATOIRES DORMER INC.

Scannez le code QR pour afficher plus de ressources ou passer une commande :



LES LABORATOIRES
DORMER

91 Kelfield Street, Unit 5, Toronto, Ontario M9W 5A3

Téléphone : 1 416 242-6167 • Téléphone sans-frais : 1 800 363-5040

Fax : 1 416 242-9487 • Fax sans-frais : 1 877 436 7637

info@dormer.com | www.dormer.com

Les produits Cantharone® ne sont pas approuvés pour la vente ou l'utilisation aux États-Unis

(R) 9001-2608F

LES LABORATOIRES
DORMER

CANTHARONE®
LIQUIDE



VÉSICATOIRE PUISSANT

TRAITEMENT EFFICACE À LA CANTHARIDINE

- Molluscum contagiosum
- Verrues periunguéales
- Verrues vulgaires
- Verrues plantaires
- Procédure simple en cabinet, aucun instrument spécial requis
- Application indolore

**APPLICATION RÉSERVÉE AUX
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ AGRÉÉS* SEULEMENT**

Lire les RENSEIGNEMENTS D'UTILISATION avant l'application

*À appliquer par des professionnels de la santé agréés ayant reçu une formation adéquate spécifique au traitement des affections indiquées et à la prise en charge des effets indésirables pouvant survenir suite à l'utilisation du produit.

INFORMATION GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT

AVANT D'UTILISER, VEUILLEZ LIRE RENSEIGNEMENTS D'UTILISATION FOURNIES DANS CHAQUE EMBALLAGE DE PRODUITS

CANTHARONE®

(Déconseillé pour les enfants de moins de 3 ans)

MOLLUSCUM CONTAGIOSUM, VERRUES VULGAIRES, VERRUES PLANTAIRES

DESCRIPTION: CANTHARONE® est un liquide topique contenant de Cantharidine 0,7% w/v dans un véhicule filmogène contenant de l'acétone, de l'huile de ricin, du collodion et du DL camphre. Le principe actif, la cantharidine, est un vésicatoire. La dénomination chimique est: Hexahydro-3a,7a-diméthyle-4b,7b-epoxyisobenzofurane-1,3-dione (C₁₀H₁₂O₄).

INDICATIONS ET MODE D'EMPLOI: CANTHARONE® est indiqué pour le traitement du Molluscum contagiosum et pour l'élimination des verrues vulgaires, périunguéales, et plantaires. Son application indolore (certaines douleurs peuvent survenir plus tard) et le fait qu'elle ne requiert aucun instrument rendent son utilisation facile, particulièrement pour traiter les enfants.

PHARMACOLOGIE CLINIQUE: L'action vésicante de la cantharidine provient de son activité acantholytique. On croit que son efficacité contre les verrues résulte de l'exfoliation de la tumeur due à cette activité acantholytique.

TRAITEMENT DES VERRUES

MOLLUSCUM CONTAGIOSUM

- Lors de la première visite, ne traitez que quelques lésions jusqu'à ce que la sensibilité du patient au produit ait été évaluée. Par la suite, plusieurs zones peuvent être traitées en une seule visite.
- À l'aide d'un applicateur pointu[†], appliquez une très petite quantité de solution uniquement au sommet de chaque lésion. Laissez sécher complètement. Un pansement non-poreux n'est pas nécessaire, mais peut être utilisé.
- Avertir le patient que la vésication est le résultat souhaité et qu'une hypopigmentation temporaire peut survenir. Le patient peut se baigner après 4 à 6 heures; plus tôt en cas d'inconfort. L'inconfort ou le picotement léger peuvent généralement être contrôlés par un bain et un sédatif au coucher.
- Après 1 semaine, traitez toute nouvelle lésion de la même façon ainsi que toutes lésions tenaces avec la CANTHARONE®, en recouvrant d'un ruban adhésif non poreux. Le pansement doit être retiré après 4 à 6 heures ou plus tôt en cas d'inconfort.

VERRUES VULGAIRES ET PÉRIUNGUÉALES

- Aucune préparation ou traitement préalable n'est requis (parfois les ongles doivent être coupés pour exposer les verrues sous-unguéales au médicament).
- À l'aide d'un applicateur pointu, appliquez CANTHARONE® directement sur la lésion; assurez-vous de couvrir complètement la verrue. Laissez sécher quelques minutes pour la formation d'une mince pellicule et couvrir d'un ruban adhésif non poreux* ou MoleSkin (le ruban occlusif est important pour une activité complète). Informer le patient de retirer le ruban adhésif dans les 24 heures et de le remplacer par un pansement lâche non plastifié.
- Lors de la prochaine visite (1 ou 2 semaines), retirer le tissu nécrosé et réappliquez CANTHARONE® sur toute excroissance persistante. Une seule application peut suffire pour une peau normalement kératinisée.

VERRUES PLANTAIRES

- Avant le traitement, bien nettoyer la peau environnante pour assurer une bonne adhérence du ruban occlusif. Il est important de bien appliquer le ruban de plastique non-poreux autour de la verrue.
- Couper la kératine couvrant la verrue; éviter de couper du tissu vivant. À l'aide d'un applicateur pointu, appliquer CANTHARONE® sur la verrue et son pourtour jusqu'à 1 à 3 mm. Laisser sécher durant quelques minutes. Protéger à l'aide d'un ruban adhésif de plastique non-poreux appliqué directement sur le site traité. Un coussinet placé sur le ruban peut être utile.
- Immobiliser le tout avec un autre ruban adhésif. 24 heures plus tard, le patient peut se laver et remplacer le pansement.
- Débrider les tissus 1 ou 2 semaines après le traitement. S'il persiste du tissu verruqueux vivant après le débridement, réappliquer une petite quantité de CANTHARONE® et un pansement tel que précédemment. Des lésions plus importantes peuvent nécessiter trois traitements ou plus.
- Pour ce qui est des grandes verrues en mosaïque, il faut en traiter une partie à la fois. L'application de CANTHARONE® sur du tissu découvert provoquera un picotement dû au solvant. On peut habituellement éviter ce problème en taillant soigneusement la verrue et en effectuant les traitements à 2 semaines d'intervalle. Une fois la verrue entièrement détruite, le site de guérison paraîtra lisse avec les lignes cutanées normales.

† L'applicateur pointu peut être un applicateur tel qu'un bâtonnet à café ou une pipette.

* Le ruban non poreux fait référence à Blenderm^{MC}. Il est recommandé de fixer le ruban non poreux sur la verrue plantaire avec un ruban adhésif de type Hypafix[®]. BLENDERM EST UNE MARQUE DE COMMERCE DE LA COMPAGNIE 3M. HYPAFIX EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DE BSN MEDICAL LIMITED.

INFORMATION IMPORTANTE

CONTRE-INDICATIONS: L'application de CANTHARONE® est déconseillée chez les diabétiques et les patients présentant des troubles circulatoires périphériques. **NE PAS UTILISER À PROXIMITÉ DES YEUX, LES MUQUEUSES, LES RÉGIONS ANO-GÉNITALES, INTERTRIGINEUSES ET AXILLAIRES.**

CANTHARONE® n'est PAS RECOMMANDÉ pour les femmes enceintes ou qui allaitent car il n'y a PAS eu d'études adéquates ou bien contrôlées sur l'utilisation de la cantharidine.

AVERTISSEMENT ET MISES EN GARDE: CANTHARONE® est un puissant vésicatoire, à utiliser avec parcimonie. La sensibilité à la cantharidine varie d'un patient à l'autre. Une réaction plus forte peut être attendue chez les patients à la peau claire et aux yeux bleus. NE PAS TRAITER DE GRANDES ZONES OU DES LÉSIONS MULTIPLES AVANT D'AVOIR ÉVALUÉ LA SENSIBILITÉ DU PATIENT AU PRODUIT. NE PAS RÉAPPLIQUER PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE SUR LA MÊME LÉSION. NE PAS APPLIQUER SUR DES TISSUS DÉJÀ IRRITÉS OU ENFLAMMÉS. L'ampoule qui se forme est souvent inflammée et douloureuse. (Voir rubrique « GESTION DE LA DOULEUR »). Différer le deuxième traitement si l'inflammation est sévère et intense. Dans de rares cas, des picotements, une sensation de brûlure ou une extrême sensibilité peuvent survenir. Si cela se produit, le patient doit retirer le ruban adhésif et tremper la zone dans de l'eau froide pendant 10 à 15 minutes et répéter au besoin pour obtenir un soulagement. Si la douleur persiste, percez l'ampoule en utilisant une méthode stérile, appliquer un antiseptique et recouvrir d'un pansement.

PRÉCAUTIONS: Les cliniciens doivent utiliser des gants sans latex lors de l'application de Cantharone®. NE PAS UTILISER DE CANTHARONE® EN COMBINAISON AVEC TOUT AUTRE TRAITEMENT CHIMIQUE CONTRE LES VERRUES. Restreindre l'application du produit sur la partie supérieure des verrues. Si du liquide est renversé sur une peau normale, essuyez-le immédiatement avec de l'acétone ou de l'alcool, suivi immédiatement d'un lavage vigoureux à l'eau tiède savonneuse et bien rincer. Si renverse sur une muqueuse ou dans les yeux, rincer à grande eau, éliminer le collodion précipité et rincer de nouveau à grande eau pendant un autre 15 minutes.

EFFETS INDÉSIRABLES: Comme pour toutes les procédures chimiques et cryogéniques, après un traitement par CANTHARONE®, des verrues annulaires superficielles peuvent se développer chez un petit pourcentage de patients. Bien qu'alarmantes pour certains patients, ces lésions sont superficielles et présentent peu de problème. Un seul cas de lymphangite chimique a été signalé à la suite de l'application d'une combinaison de collodion de cantharidine en association avec un emplâtre d'acide salicylique. Un cas de vésication extrême et douloureuse a été rapporté après le traitement de lésions axillaires multiples.

GESTION DE LA DOULEUR:

- Avertir le patient que l'ampoule peut être douloureuse. Prescrire un analgésique léger.
- Le pansement peut être retiré et la zone trempée dans de l'eau froide pendant 10 à 15 minutes au besoin, à condition que suffisamment de temps ait été accordé pour que le médicament pénètre la verrue.
- À la discrétion du médecin, l'ampoule peut être percée à l'aide d'une technique stérile et recouverte d'un antiseptique et un pansement.

SOIN APRÈS TRAITEMENT:

- Il est recommandé d'utiliser un savon doux antibactérien jusqu'à ce que le tissu se réépithélialise.
- Fournir la feuille de renseignements Cantharone® aux patients.

LES LABORATOIRES
DORMER



Application réservée pour praticien de la santé agréé SEULEMENT

NE PAS distribuer ou prescrire CANTHARONE® aux patients en raison de la toxicité et du mauvais usage potentiel.